

Le 1 février 2007

La SOGC accueille favorablement les recommandations du Comité consultatif national de l'immunisation au sujet de la Vaccination contre le cancer du col utérin

OTTAWA - La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) accueille favorablement la recommandation du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) selon laquelle les Canadiennes dont l'âge se situe entre 9 et 26 ans devraient bénéficier d'une vaccination en vue de les protéger contre le virus du papillome humain (VPH), lequel constitue la principale cause du cancer du col utérin et d'autres maladies gynécologiques.

« Les recommandations du CCNI constituent un pas important vers la prévention du VPH chez les Canadiennes », a affirmé le Dr Donald Davis, président de la SOGC. « Maintenant, il faut que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux agissent rapidement afin d'élargir l'accès à la vaccination contre le VPH. À l'heure actuelle, les Canadiens doivent s'acquitter eux-mêmes des frais associés aux injections; la SOGC estime que les filles et les jeunes femmes devraient avoir accès à la vaccination, peu importe leur situation financière et l'endroit où elles demeurent au Canada. »

L'immunisation constitue une nouvelle stratégie contribuant à l'élimination des maladies gynécologiques causées par le VPH. Bien que l'utilisation du vaccin ait été approuvée au Canada en juillet 2006, le gouvernement fédéral attendait d'obtenir les recommandations du rapport du CCNI avant d'envisager la mise sur pied d'un programme de vaccination financé par les deniers publics. « Maintenant que ces recommandations ont été publiées, nous espérons que le Comité canadien sur l'immunisation passera rapidement à la prochaine étape, soit l'opérationnalisation d'un programme de vaccination subventionné par l'État », a affirmé le Dr Davis.

En dépit des issues positives que permet la vaccination en matière de prévention, la SOGC continue de souligner l'importance d'avoir recours à des tests de Pap annuels afin de diagnostiquer, le plus tôt possible, toute présence d'une activité cellulaire anormale.

Cancers gynécologiques associés au VPH

Trois Canadiens sur quatre (75 pour cent) connaîtront probablement au moins une infection au VPH au cours de leur vie. En plus d'être associée aux cancers de la vulve et du vagin, l'infection au VPH peut causer des lésions cervicales et génitales de bas grade histologique, ainsi que l'obtention de résultats anormaux aux tests de Pap. Les types 6, 11, 16 et 18 du VPH sont à l'origine de 70 pour cent des cancers anogénitaux et des lésions précancéreuses, de 35 à 50 pour cent de toutes les lésions cervicales bénignes et de plus de 90 pour cent des verrues génitales.

Le cancer du col utérin est le deuxième cancer en importance chez les Canadiennes dont l'âge se situe entre 20 et 44 ans; chaque année, près de 1 400 nouveaux cas sont diagnostiqués et il est à l'origine de plus de 400 décèsⁱⁱⁱ. De surcroît, plus de 200 Canadiennes meurent d'un cancer de la vulve / du vagin chaque année^{iv}. Fait peu connu par la plupart des gens, le Canada compte l'un des taux signalés de cancer de la vulve les plus élevés du monde^v.

À propos de la SOGC

La SOGC est l'une des plus anciennes organisations nationales de spécialité au Canada. Fondée en 1944, la Société a pour mandat de promouvoir l'excellence dans la pratique de l'obstétrique-gynécologie et la santé des femmes par le leadership, la défense des droits, la collaboration, la prise de contact et l'éducation. La SOGC représente des obstétriciens-gynécologues, des omnipraticiens, des infirmières, des sages-femmes et des professionnels paramédicaux œuvrant dans le domaine de la santé sexuelle et génésique. Pour plus de renseignements, consultez le site Web www.sogc.org.

Personne-ressource :

Mike Haymes

Rédacteur, Communications et éducation publique
Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC)
Tél. : (800) 561-2416 ou (613) 730-4192, poste 325
Télé. : (613) 730-4314
Courriel : mhaymes@sogc.com | Web : www.sogc.org

ⁱ Santé Canada, page Web « Votre santé et vous »

(Disponible à http://www.hc-sc.gc.ca/iyh-vsv/diseases-maladies/hpv-vph_f.html).

ⁱⁱ *Efficacy of a Prophylactic Quadrivalent Human Papillomavirus (HPV) (Types 6, 11, 16, 18) L1 Virus-Like Particle (VLP) Vaccine for Prevention of Cervical Dysplasia and External Genital Lesions (EGL)*.

Présentation de C. Sattler dans le cadre de la 45^e *Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy* (ICAAC) annuelle à Washington, DC.

ⁱⁱⁱ Société canadienne du cancer, Statistiques canadiennes sur le cancer 2005.

^{iv} Statistiques Canada. Tableau CANSIM 102-0522. Décès, selon la cause, Chapitre II Tumeurs (C00 à D48), le groupe d'âge et le sexe, Canada, 2000-2003.

^v Rapport de surveillance de la santé des femmes. Publié le 30 septembre 2003. (Disponible à http://www.cihi.ca/cihiweb/disPage.jsp?cw_page=PG_29_E&cw_topic=29&cw_rel=AR_342_F).